

動物用医薬品
Lux San X
ラクサンX
乳頭殺菌消毒剤

- 【成分及び分量】 ヨウ素混合液 7.2 g/100 g
(有効ヨウ素として 1 w/w%)
- 【用法及び用量】 原液をコップ等の容器に入れ、毎搾乳直後、乳頭を短時間浸漬する。
- 【効 能 効 果】 牛の乳頭の殺菌及び消毒
- 【貯 蔵 方 法】 密閉して直射日光を避けて保管する。
- 【使用上の注意】 (基本的事項)

【一般的注意】

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

【取扱い及び廃棄のための注意】

- ・腐食性があるため金属性のコップを使用しないこと。
 - ・よく振り混ぜてから使用すること。
 - ・乳汁等是有効ヨウ素を消費し本剤の消毒効果を減衰させるので、多量の乳汁等が混入した場合は廃棄し、新たに容器に入れ使用すること。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。
 - ・本剤が飲食物、飼料、被服、小児のおもちゃ等にかからないように注意すること。
 - ・本剤の保管は密栓して、直射日光、高温及び多湿を避け、寒冷時に凍結しないような場所に保管すること。
 - ・火気や熱源のそばに保管しないこと。
 - ・万一凍結した場合は、室温にて温め、使用前に混和すること。
 - ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
 - ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
2. 使用に際して気を付けること

【使用者に対する注意】

- ・本剤の使用により、発疹、掻痒感等の過敏性徴候が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ・本剤の取扱いにはゴム手袋等を使用し、皮膚に付着しないように注意すること。万一、使用者の皮膚に付着した場合は、直ちに流水で洗い流すこと。
- ・本剤が眼に入らないように注意すること。万一、眼に入った場合は、こすらず直ちに流水で洗眼すること。5分程洗浄した後、コンタクトレンズを着用している場合ははずし、洗浄を続けること。洗浄後、本剤を持参して速やかに医師の診察を受けること。
- ・本剤を誤飲しないように注意すること。万一、誤飲した場合は、多量の水を飲ませて吐き出させる等適切な処置を行い、直ちに医師の診察を受けること。

【牛に関する注意】

- ・本剤の使用により、発疹等の過敏反応が現れることがあるが、このような症状が現れた場合には使用を中止すること。
- ・乳頭に傷、ひび割れ等がある場合は、使用する前に獣医師に相談すること。
- ・乳頭が乾燥する前に横臥すると糞、敷き料等の有機物が付着することがあるので、乳頭浸漬後は、乳頭が乾燥するまで牛を立たせておくこと。
- ・特に寒冷地で使用する場合は、乳頭が凍傷になる恐れがあるので、乳頭浸漬後1分程度処置したあとで、新しいペーパータオル等で本剤を拭き取るか、または室温にて乳頭を乾燥させること。

【取扱い上の注意】

- ・本剤を搾乳前の消毒に使用しないこと。
- ・本剤は希釈せず原液で使用する。
- ・搾乳毎に新しい薬剤を用いること。
- ・ディッピングに用いるコップやノンリターンディッパー等の器具は使用する前によく洗浄すること。
- ・使用した器具は、よく洗浄すること。

【包 装】 ポリエチレン容器 【使 用 期 限】 容器ラベルに記載

製造販売元: **GEA オリオンファームテクノロジーズ株式会社**

長野県 須坂市 大字幸高 246番地

製 造 元: **GEA Farm Technologies Inc.** U. S. A. (米国)