

動物用医薬品
THERATEC
セラテック
乳頭殺菌消毒剤

- 【成分及び分量】 ノノキシノールヨード液 2.66 w/w% (有効ヨウ素として 0.5%)
【用法及び用量】 搾乳前：乳頭の汚れを落とした後、原液を清水で5倍に希釈し、乳頭を短時間浸漬後、布タオル等で乳頭を拭いて乾かし、ミルカーを装着する。
搾乳後：原液をコップ等の容器に入れ、毎搾乳後、乳頭を短時間浸漬する。
【効能効果】 牛の乳頭の殺菌及び消毒
【貯蔵方法】 遮光保存
【使用上の注意】 (基本的事項)

1. 守らなければならないこと

【一般的注意】

- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は外用以外には使用しないこと。

【取扱い及び廃棄のための注意】

- ・有機物は有効ヨウ素を消費するので混入をさけること。万一、多量の乳汁等が混入した場合は廃棄し、新たに本剤を容器に入れ使用すること。
- ・一度使用した液で、長時間放置したものの再使用は避けること。
- ・よく振り混ぜてから使用すること。
- ・一度使用し残った液は、絶対に容器に戻さないこと。
- ・他の殺菌消毒剤の混入は避けること。
- ・本剤の保管は密栓して、直射日光、高温及び多湿を避け、寒冷時に凍結しないような場所に保管すること。
- ・万一凍結した場合は、室温にて温め、使用前によく混和すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に準拠して処分すること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に準拠して処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

【使用者に対する注意】

- ・本剤が眼や口に直接入らないように注意すること。
- ・万一、眼に入った場合は、多量の水で洗った後、眼に異常が感じられる場合は、医師の診察を受けること。
- ・万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

【牛に関する注意】

- ・本剤の使用により、まれに発疹等の過敏症状があらわれる事があるが、この場合は使用を中止すること。
- ・副作用が認められた場合は、速やかに獣医師の診察を受けること。

【取扱い上の注意】

- ・搾乳前、乳頭をよく洗浄すること。
- ・搾乳前に使用した場合はミルカー装着前に乳頭に付着した薬液を布タオル等で拭き取ること。

- 【包装】 ポリエチレン容器
【使用期限】 容器ラベルに記載

製造販売元： **GEA オリオンファームテクノロジーズ株式会社**
長野県 須坂市 大字幸高 246番地
製 造 元： **GEA Farm Technologies Inc.**
U. S. A. (米国)